


NCGM COVID-19 治療フローチャート (成人)

2021年2月25日 第2版作成



* 10,000 単位/日で投与開始。APTT は延長させなくてもいい。基本は経静脈投与だが酸素量 5L/分未満なら皮下注でも可。

薬剤名	投与量	投与期間	使用注意	その他
レムデシビル (ベクルリー®)	初回 200mg 1日1回 翌日以降 100mg 1日1回	5~10日間	① eGFR < 30mL/min ② ALT が正常上限の5倍以上	5日間で臨床症状の改善を認めなければ10日間まで投与延長可
デキサメタゾン	経口・経管 デカドロン錠®4mg 1.5錠 1日1回 経 静 脈 デキサート注射液®6.6mg 1筒 1日1回	7~10日間(酸素需要が消失したら終了可)	① 活動性消化管出血 ② 本薬剤にアレルギーあり	40kg未満では0.15mg/kg/日に減量。妊婦・授乳婦にはプレドニゾン40mg/日で代用。デキサメタゾン以外にも、プレドニゾンやメチルプレドニゾン、パルス療法も行われている。
トシリズマブ (アクテムラ®)	8mg/kg (上限 800mg) を静注 1日1回 ※本薬剤は適応外使用につき各施設内で手続きが必要である	1日間	① 活動性肺結核の可能性がある ② ALT が正常上限の5倍以上 ③ 好中球数 < 500/mm ³ ④ 血小板数 < 5万/mm ³	投与前に結核、非結核性抗酸菌症、B型肝炎のスクリーニングを実施(胸部画像検査、QFT/T-SPOT、HBs抗原・HBs抗体・HBc抗体)