NCGM　COVID-19　治療フローチャート（成人）

2021 年 5 月 10 日 第 3 版作成



* 10,000 単位/日で投与開始。APTT は延長させなくてもいい。基本は経静脈投与だが酸素量 5L/分未満なら皮下注でも可。

薬剤名	投与量	投与期間	使用注意	その他
レムデシビル （ベクルリー®）	初回 200mg 1 日 1 回 翌日以降 100mg 1 日 1 回	5～10 日間	① eGFR< 30mL/min ② ALT が正常上限の 5 倍以上	5 日間で臨床症状の改善を認めなければ 10 日間まで投与延長可
デキサメタゾン	経口・経管 デカドロン錠®4mg 1.5 錠 1 日 1 回 経 静 脈　デキサート注射液®6.6mg 1 筒 1 日 1 回	7～10 日間（酸素需要が消失したら終了可）	① 活動性消化管出血 ② 本薬剤にアレルギーあり	40kg 未満では 0.15mg/kg/日に減量。妊婦・授乳婦にはプレドニゾロン 40mg/日で代用。デキサメサゾン以外にも、プレドニゾロンやメチルプレドニゾロン、パルス療法も行われている。
トシリズマブ （アクテムラ®）	8mg/kg（上限 800mg）を静注　1 日 1 回 ※本薬剤は適応外使用につき各施設内で手続きが必要である	1 日間	① 活動性肺結核の可能性がある ② ALT が正常上限の 5 倍以上 ③ 好中球数＜500/mm^3 ④ リンパ球数＜500/mm^3 ⑤ 血小板数＜5 万/mm^3	投与前に結核、非結核性抗酸菌症、B 型肝炎のスクリーニングを実施（胸部画像検査、QFT/T-SPOT、HBs 抗原・HBs 抗体・HBc 抗体）
バリシチニブ （オルミエント®）	4mg を 1 日 1 回内服 30≦eGFR＜60 の場合は 2mg に減量	最大 14 日間		