新型コロナウイルス感染症(COVID-19陽性)

パス日数 15日間	適応基準	除外条件	目標
	①PCR検査の結果がCOVID-19陽性患者で医師が入院加療が必要と判断した患者 ②酸素需要がない(軽症)、もしくは酸素投与量が4㍑以下(中等症)の患者	①PCR検査が未検査もしくは検査結果待ちの患者 ②酸素需要が5㍑以上必要な呼吸状態 ③NHF、NPPV、気管内挿管を必要とする患者	①原則、発症日から10日間経過かつ症状軽快後72時間経過すること ②症状症状軽快後24時間後に、24時間以上間隔をあけて2回のPCR検査陰性を確認すること

日付		01月01日	01月02日	01月03日	01月04日	01月05日	01月06日	01月07日	01月08日	01月09日	01月10日	01月11日	01月12日	01月13日	01月14日	01月15日
ユニット名		入院日	経過観察期													
イベント名		1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目	14日目	15日目
入外区分		入院														
ｸﾘﾃｨｶﾙｲﾝﾃﾞｨｹｰﾀ																
アウトカム	患者状態	発熱のコントロールができている	スキントラブルがない	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		スキントラブルがない	呼吸状態が安定している	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		皮膚障害の症状・所見がない	精神状態が安定している	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		呼吸状態が安定している	発熱のコントロールができている	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		精神状態が安定している	皮膚障害の症状・所見がない	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		せん妄の症状・所見がない	せん妄の症状・所見がない	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	生活動作	転倒予防行動ができる	転倒予防行動ができる	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	知識・教育	入院生活(隔離)について理解できる						社会的支援の内容について理解できる							社会的支援の内容について理解できる	
	合併症															
	その他															
定型文書		退院支援スクリーニング														
		DVTリスクアセスメントシート内科系														
		新型コロナウィルス感染症(COVID-19 陽性)入院診療計画書(第2版)Ver2.3														
		救急医療管理加算乳幼児救急医療管理加算確認表【H28.4.1改定】														
		身体抑制に関する説明書・同意書														
		新型コロナウイルス感染症_発生届														
治療	処方															
	注射															
	処置	外泊 不可	その他の著変時、Dr call													
		バイタルサイン:2検	空気感染対策(N95対応)													
		接触感染対策(アルコール可)	バイタルサイン:2検													
		空気感染対策(N95対応)	接触感染対策(アルコール可)													
		身長・体重測定(指示のみ)	安静度													
		安静度	外泊 不可													
		面会	面会													
		その他の著変時、Dr call														
	リハビリ															
	輸血															
検査	検体検査	血清・赤分離 他			血清・赤分離 他				血清・赤分離 他							血清・赤分離 他
	病理															
	画像・生理	放）胸部 A→P 座位			放）胸部 A→P 座位				放）胸部 A→P 座位							放）胸部 A→P 座位
		生）標準12誘導心電図(自科)														
食事	朝															
	昼															
	夜															
栄養指導																
患者状態																
- 看護ケア	基本メニュー	体温(腋窩) 毎日 (10:00,19:00)	体温(腋窩) 毎日 (10:00,19:00)													
		呼吸数 毎日 (10:00,19:00)	呼吸数 毎日 (10:00,19:00)													
		脈拍数 毎日 (10:00,19:00)	脈拍数 毎日 (10:00,19:00)													
		SPO2 毎日 (10:00,19:00)	SPO2 毎日 (10:00,19:00)													
		血圧(収縮期) 毎日 (10:00,19:00)	血圧(収縮期) 毎日 (10:00,19:00)													
		血圧(拡張期) 毎日 (10:00,19:00)	血圧(拡張期) 毎日 (10:00,19:00)													
	食事(摂取量)	食事摂取量(主食) 毎日 (08:00,13:00,19:00)	食事摂取量(主食) 毎日 (08:00,13:00,19:00)													
		食事摂取量(副食) 毎日 (08:00,13:00,19:00)	食事摂取量(副食) 毎日 (08:00,13:00,19:00)													
	計測	体重(kg) 毎日 (10:00)														
		身長 毎日 (10:00)														
	排出量(回数)	便回数 毎日 (10:00)	便回数 毎日 (10:00)													
	消化器	便性状 毎日 (10:00)	便性状 毎日 (10:00)													
		嘔気 毎日 (10:00,19:00)	嘔気 毎日 (10:00,19:00)													
	医療安全	転倒防止ケア 毎日(10:00)	転倒防止ケア 毎日(10:01)													
	オリエンテーション	入院時オリエンテーション 毎日 (10:00)	そのほかの検査オリエンテーション 毎日(16:00)													
	コンサルテーション	ソーシャルワーカー・社会福祉士へのコンサルテーション依頼 毎日 (10:00)	ソーシャルワーカー・社会福祉士へのコンサルテーション依頼 毎日 (10:00)	ソーシャルワーカー・社会福祉士へのコンサルテーション依頼 毎日 (10:00)				その他社会保障支援 毎日 (10:00)							その他社会保障支援 毎日 (10:00)	
								社会資源活用のための調整 毎日 (10:00)							社会資源活用のための調整 毎日 (10:00)	
	生活行動援助	ベッドメイキング	ベッドメイキング													
		危険行動の種類	危険行動の種類													
		ADLシャワー浴	ADLシャワー浴													
		ADL清拭	ADL清拭													
	指導	褥瘡管理の指導	褥瘡管理の指導													
		転倒予防の指導	転倒予防の指導													
	循環援助	褥瘡予防	褥瘡予防													
	精神	不眠	不眠													
		不安	不安													
		落ち着きのなさ	落ち着きのなさ													
	呼吸器	呼吸数の異常 毎日 (10:00,19:00)	呼吸数の異常 毎日 (10:00,19:00)													
		喘鳴 毎日 (10:00,19:00)	喘鳴 毎日 (10:00,19:00)													
		呼吸音減弱 毎日 (10:00,19:00)	呼吸音減弱 毎日 (10:00,19:00)													
		努力呼吸の種類 毎日 (10:00,19:00)	努力呼吸の種類 毎日 (10:00,19:00)													
		呼吸困難(労作時) 毎日 (10:00,19:00)	呼吸困難(労作時) 毎日 (10:00,19:00)													
		呼吸困難(安静時) 毎日 (10:00,19:00)	呼吸困難(安静時) 毎日 (10:00,19:00)													
		副雑音(右) 毎日 (10:00,19:00)	副雑音(右) 毎日 (10:00,19:00)													
		副雑音(左) 毎日 (10:00,19:00)	副雑音(左) 毎日 (10:00,19:00)													
		副雑音の種類 毎日 (10:00,19:00)	副雑音の種類 毎日 (10:00,19:00)													
	観察	咳嗽 毎日 (10:00,19:00)	咳嗽 毎日 (10:00,19:00)													
		咳嗽の種類 毎日 (10:00,19:00)	咳嗽の種類 毎日 (10:00,19:00)													
		喀痰 毎日 (10:00,19:00)	喀痰 毎日 (10:00,19:00)													
		喀痰喀出状況 毎日 (10:00,19:00)	喀痰喀出状況 毎日 (10:00,19:00)													
		喀痰粘稠度 毎日 (10:00,19:00)	喀痰粘稠度 毎日 (10:00,19:00)													
		喀痰性状 毎日 (10:00,19:00)	喀痰性状 毎日 (10:00,19:00)													
		嗅覚低下 毎日 (10:00,19:00)	嗅覚低下 毎日 (10:00,19:00)													
		酸素吸入量 毎日 (10:00,19:00)	酸素吸入量 毎日 (10:00,19:00)													
		受け持ち看護師 毎日 (10:00,17:00)	受け持ち看護師 毎日 (10:00,17:00)													
	歯科・口腔	味覚異常 毎日 (10:00,19:00)	味覚異常 毎日 (10:00,19:00)													
	脳神経	意識評価(JCS) 毎日 (10:00,19:00)	意識評価(JCS) 毎日 (10:00,19:00)													
指示コメント		【入院時確認事項】医師は必ず確認してください ■外来カルテが作成されているかを確認すること	カロナール、アセリオはそれぞれ4時間以上あけて、アセトアミノフェン量として1日合計4000mgまで。													
		カロナール、アセリオはそれぞれ4時間以上あけて、アセトアミノフェン量として1日合計4000mgまで。	SpO2目標94%目標未満なら酸素投与開始、最大4LでDr call。目標以上なら酸素減量可、最小オフ可。													
		SpO2目標94% 目標未満なら酸素投与開始、最大4LでDr call。 目標以上なら酸素減量可、最小オフ可。														
		【入院担当の看護師へ】 ・オリエンテーション用紙「新型コロナウイルス感染症で入院された患者さん...														
必要時	熱が38度以上	カロナール錠200mg 2錠	カロナール錠200mg 2錠													
		アセリオ静注液バッグ 1000mg/100mL 500mg	アセリオ静注液バッグ 1000mg/100mL 500mg													
		ロキソプロフェン錠60mg 1錠	ロキソプロフェン錠60mg 1錠													
	疼痛がある場合	カロナール錠200mg 2錠	カロナール錠200mg 2錠													
		アセリオ静注液バッグ 1000mg/100mL 1000mg	アセリオ静注液バッグ 1000mg/100mL 1000mg													
		ロキソプロフェン錠60mg 1錠	ロキソプロフェン錠60mg 1錠													
	吐き気または気分不快時	メトクロプラミド錠5mg 1錠	メトクロプラミド錠5mg 1錠													
		塩酸メトクロプラミド注射液10mg/2mL 1A	塩酸メトクロプラミド注射液10mg/2mL 1A													
	不眠の場合	リスペリドン内用液(1mg/mL)0.5mL 1包	リスペリドン内用液(1mg/mL)0.5mL 1包													
		ベルソムラ錠15mg 1錠	ベルソムラ錠15mg 1錠													
	不穏がある場合	リスペリドン内用液(1mg/mL)0.5mL 1包	リスペリドン内用液(1mg/mL)0.5mL 1包													
	掻痒時	ヒルドイドローション0.3% 25g 1本	ヒルドイドローション0.3% 25g 1本													
		レスタミンコーワクリーム1% 20g	レスタミンコーワクリーム1% 20g													
	便秘時	ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75% 10mL 1本	ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75% 10mL 1本													
		センノシド錠12mg 1錠	センノシド錠12mg 1錠													
	血圧:180mmHg以上	Dr.Call	Dr.Call													
	血圧:80mmHg以下	Dr.Call	Dr.Call													
	心拍数:140回／分以上	Dr.Call	Dr.Call													
	心拍数:50回／分以下	Dr.Call	Dr.Call													
	フリー	ヘパリンNa注 10000単位/10mL 10000単位	ヘパリンNa注 10000単位/10mL 10000単位													